

பயிர்ப் பாதுகாப்பு
அ. பூச்சி மேலாண்மை
பூச்சிகள்
குருத்து ஈ

மேலாண்மை முறைகள்

- விதைப்புக்குமுன்பு விதை நேர்த்தி செய்த விதையினைப் பயன்படுத்தவும் (பார்க்க சோளம்).
- இமிடாக்குளோப்ரிட் 70 டபுள்யு. எஸ். 10 கி. என்ற அளவில் ஒரு கிலோ விதையுடன் கலந்து விதைக்கவும்
- அறுவடை செய்தவுடன் நிலத்தை உழவேண்டும் மற்றும் பயிரின் தண்டுகளைச் சேகரித்து அழிக்கவும்
- ஒரு எக்டருக்கு 12 த.நா.வே.ப. குறைந்த விலை கருவாட்டுப் பொறியை வைக்கவேண்டும். இப்பொறியைப் பயிரின் வயது 30 நாள் ஆகும் வரை வயலில் வைத்து ஈக்களைக் கவர்ந்து அழிக்கவும்.
- கீழ்க்கண்ட பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை எக்டருக்கு 500 லி. தண்ணீரில் கலந்துத் தெளிக்கவும்.
என்டோசல்பான் 35 இ.சி. 500 மி.லி.
மீதைல் டெமட்டான் 25 இ.சி. 500 மி.லி

தண்டுத்துளைப்பான்

வேப்பங்கொட்டைச் சாறு கரைசல் 5 சதம்

அசாடிர்க்டின் 1 சதம்

போரேட் 10 சதம் குருணை மருந்தை எக்டருக்கு 40 கிலோ என்ற அளவில் விதைக்கும் தருணத்தில் மண்ணில் இடவும்

கீழ்க்கண்ட குருணைப் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை மணலுடன் கலந்து ஒரு எக்டருக்கு 50 கிலோ அளவுக்கு மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இதனை விதைத்ததிலிருந்து 20 நாள் வயதுடைய பயிர்களின் குருத்தில் இடவேண்டும்

குயினால்பாஸ் 5 சத குருணை 15 கிலோ

கார்பரில் 4 சத குருணை 20 கிலோ

- குருணை பூச்சிக்கொல்லியை பயன்படுத்தாவிடில் குயினால்பாஸ் 25 இ.சி. 1 லி. அல்லது கார்பரில் 50 நனையும் தூள் 1 கிலோ 20 வது நாளில் தெளிக்கவும்.

கதிர்ப்புழு

எக்டருக்கு கார்பரில் 10 சதத் தூள் 25 கிலோ (அ) கார்பரில் நனையும் தூள் 1 கிலோ பயன்படுத்தவும்.