

 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	05/09/2018	முதல்		09/09/2018
	அறிக்கை எண் :	070/2018	வெளியீட்டு நாள் :	04/09/2018			

கடந்த கால வானிலை	31/08/2018	முதல்	03/09/2018	வரை
காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை			
மழை (மி.மீ)	36.2			
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	33-37			
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	23-25			
மேக மூட்டம்	6-7			
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	45-83			
காற்றின் வேகம்(கி.மீ. / மணி)	3-7			

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 09-09-2018 8.30 மணி வரை)

காரணிகள்	05-09-2018	06-09-2018	07-09-2018	08-09-2018	09-09-2018
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	1	0	0	0	0.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	35	35	36	36	36
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25	25	25	25	25
மேக மூட்டம்	6	6	5	5	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	75	75	75	75	75
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	40	35	30	30	35
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	8	8	8	6	6
காற்றின் திசை	வடமேற்கு	வடமேற்கு	வடமேற்கு	வடமேற்கு	வடமேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

வரும் செப்டம்பர் 5 மற்றும் 9ம் தேதிகளில் ஆங்காங்கே மிக லேசான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 6 முதல் 8 கி.மீ வேகத்தில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள் : கரும்பு & (கால்நடை)

நிலவும் பருவச்சூழ்நிலையில் கரும்பு பயிரில் வெள்ளை ஈக்களின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படவாய்ப்பு உள்ளது. தாக்குதலின் அறிகுறியாக இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகும், சோகைகள் இளஞ்சிவப்பு அல்லது கருஊதா / நாவல் நிறமாக மாறிப் பின் உலர்ந்து காய்ந்து போகும். பாதிக்கப்பட்ட சோகைகளில் வெள்ளை மற்றும் கறுப்புப் புள்ளிகள் காணப்படும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது இலைகள் எரிந்தது போல் தோற்றமளிக்கும். கரும்பின் வளர்ச்சி தாமதமாகும். சோகைகளில் கூட்டுப்புழுக்கள் கூடுகட்டி இருப்பதால் சோகைகளை உரித்து உடனே எரித்து விட வேண்டும். 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 2 கிராம் அசிப்பேட் மருந்தினை கரைத்து தெளிக்க வேண்டும் மீண்டுமொரு முறை 1 மாதம் கழித்து தெளிப்பதன் மூலம் முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் குஞ்சுகள் அழிக்கப்படும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 125 கிராம் தையமெத்தாக்ஸன் 25WG மருந்தினை 750 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூசவேண்டும்.