



தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சிநிலையம் - ஆடுதுறை
திருவாரூர் மாவட்டவானிலைசார்ந்தவேளாண் அறிக்கை
(04.10.2023 முதல் 08.10.2023)



அறிக்கைஎண்: 79/2023

தேதி : 03.10.2023

திருவாரூர் மாவட்டத்தின் கடந்தவாரவானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 - 35 °செ ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 - 26 °செ ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (04.10.2023 முதல் 08.10.2023).

கடந்தவாரவானிலை (29.09.2023 முதல் 02.10.2023)				காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு (04.10.2023 முதல் 08.10.2023) வரை				
நாள்-1 29/09	நாள்-2 30/09	நாள்-3 01/10	நாள்-4 02/10	தேதி	நாள்-1 04/10	நாள்-2 05/10	நாள்-3 06/10	நாள்-4 07/10	நாள்-5 08/10
4.0	0	6.0	0	மழை (மி.மீ.)	0	0	0	2	0
35	33	34	35	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35	36	36	35	35
25	25	26	26	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	26	25	25	25	25
6	6	6	5	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	3	1	4	6	4
81-63	74-71	78-62	74-65	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80-40	80-40	80-40	90-40	80-50
4	4	4	4	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	18	16	16	16	16
மேற்கு வட மேற்கு	மேற்கு வட மேற்கு	மேற்கு வட மேற்கு	மேற்கு வட மேற்கு	காற்றின் திசை	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தெற்கு

திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 07.10.2023 அன்று லேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 - 36 °செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 - 26 °செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 - 90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 - 50 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 - 18 கி.மீ. என்ற அளவுக்கு பெரும்பாலும் தென் தென் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது		உழவர் பெருமக்கள் அனைவரும் தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேளாண் சார்ந்த செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது (TNAU AAS, Meghdoot and DAMINI).
நெல்	நாற்றாங்கால்	வறண்ட வானிலையை பயன்படுத்தி, உரம் மற்றும் மருந்துகளை தெளிக்கவும். நெல் வயலுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 32.6 கிலோ யூரியா மற்றும் 8.4 கிலோ பொட்டாஷ் உரத்தினை நடவு செய்த 35 ம் நாள் இடவும்
நெல்	நடவு வயல்	தற்போது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக நடவு வயலில் இலைபேன் தாக்குதல் ஆங்காங்கே தென்படுவதால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையாமீத்தாக்கை 25 WG நனையும் தூள் 40 கிராம் ஏக்கர் என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்
வாழை		தற்போது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் பச்சை தத்துப்பூச்சியின் தாக்கம் தென்பட்டால் கட்டுப்படுத்த தையாமீத்தாக்கை 25 WG 0.6 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது இமிடாகுளோபரிட் 17.8 SL 0.6 கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்
கால்நடைகள்	மாடு	பருவ மழை தொடங்குவதற்கு முன்னால் கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி போடவும்.

குறுஞ்செய்தி

உழவர் பெருமக்கள் அனைவரும் தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேளாண் சார்ந்த செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது (TNAU AAS, Meghdoot and DAMINI).

இயக்குநர்