



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	69	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	40	40	31	31
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	11	12	11	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	247	251	285	249	249
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுகள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	69	68	67	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	41	40	34	33
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	12	12	11	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	242	251	277	246	246
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	69	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	40	40	31	31
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	11	13	11	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	250	253	283	254	254
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் ஆவடையார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	69	68	66	75
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	42	40	35	34
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	13	13	11	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	238	250	271	243	243
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	6	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 14 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்ட செடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும், தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	35.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	25.0	25.0	26.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	61	53	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	40	40	39	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	16	16	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	234	251	271	253	253
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	6	5	5	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.0°C - 26.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	36.0	34.0	35.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	65	61	75
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	45	40	40	35	35
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	14	14	13	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	241	252	275	253	253
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	6	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 34.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 25.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 13 - 15 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்சம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	68	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	40	40	32	32
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	14	14	14	15
காற்றின் திசை (கோணம்)	257	260	276	269	269
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 - 15 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்ட செடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும், தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	69	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	41	40	32	32
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	11	12	11	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	246	251	283	248	248
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	40	40	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	10	12	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	250	250	289	250	250
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	40	40	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	10	12	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	250	250	290	250	250
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10- 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஒட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	68	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	42	40	34	33
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	12	12	11	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	240	252	274	244	244
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	6	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுகள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	68	67	65	73
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	42	40	37	35
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	13	13	12	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	237	249	267	243	243
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	6	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 - 15 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	69	68	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	41	40	32	32
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	14	14	14	15
காற்றின் திசை (கோணம்)	256	261	274	269	269
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.0°C - 35.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23.0°C - 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 - 15 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

பகல் நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் கறவை மாடுகளின் மேல் தண்ணீர் தெளித்துத் அதன் வெப்பத்தை தணிப்பது மூலம் பால் உற்பத்தி குறையாமல் பாதுகாக்கலாம். மேலும் அசோலா பசுந்தீவனம் மாக பயன்படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

கறவை மாடுகளின் மடி வீக்க நோய் கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு மாடு பால் கறக்கும் போது முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	பருத்தியில் மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்டால், இலையின் அடிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று காணப்படும். இதனால் கரிப்பூசணவளர்ச்சியும் காணப்படும். தாக்கப்பட்டசெடிகள் வாடி, கருப்பு நிறமாக மாறும். இதனை கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு பின்வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கலாம். வேப்பெண்ணெய் 2% (20மிலி/லிட்டர்) அல்லது மீன் எண்ணெய் மற்றும் காதி சோப் 25 கிராம் / லிட்டர் அல்லது ப்ரோபெனோபாஸ் 800ml/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோயினை பரப்பும் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்த 5% வேப்ப விதை சாறு அல்லது தயாமெதாக்கம் 25 WG – 50g/ஏக்கர் என்ற அளவில் கைத்தெளிப்பான் கொண்டு தேளிக்கவும். மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் ஏக்கருக்கு 10 எண்ணம் என்ற அளவில் வைத்துத் வெள்ளை ஈயின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும்.
நெல்	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சமீபத்தில் நெல் விதைத்த நாற்றங்காலிலும், நடவு வயலிலும் மழை வரும் சமயங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் தேக்குவதன் மூலம் விதைத்த நெல் மற்றும் நடவு செய்த நாற்றுக்கள் இடம் மாறுவது தடுக்கப்படும். பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு செய்யும் விரும்பும் விவசாயிகள் தக்கை பூண்டு கொழிஞ்சி, சணப்பை போன்ற பசுந்தாள் உரங்களை விதைத்து 45 நாட்கள் கழித்து அந்த இடத்திலே உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தற்போது நிலவி வரும் அதிக வெப்பத்தினால் தென்னைமரத்தில் இளம் குரும்பைகள் உதிர தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அதிக மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே , விவசாயிகள் தென்னை மரத்தை சுற்றிலும் பண்ணை கழிவுகளை இட்டு நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். மேலும் , தென்னை மரத்திற்கு வேர் மூலம் தென்னை டானிக் 200 மில்லி/மரத்திற்கு 3 மாத இடைவெளியில் கொடுத்து குரும்பை உதிர்வதை தடுக்கலாம்.