



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	23/09/2023	மாதல்	27/09/2023
அறிக்கை எண் :	076/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	22/09/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (17.09.2023 மாதல் 21.09.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு -27-09-2023- 08.30 வரல					
17/09	18/09	19/09	20/09	21/09	ததே	நாள்-1 23/09	நாள்-2 24/09	நாள்-3 25/09	நாள்-4 26/09	நாள்-5 27/09
0.0	24.8	12.5	12.5	3.0	மழை (மி.மீ)	2	4	3	6	9
37	38	36	34	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	37	37	36	36	36
26	26	24	25	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	25	25	24	24	24
6	8	6	6	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	7	5	8	8	8
72	82	93	78	60	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	70	70	80	80
52	93	84	50	82		50	50	50	50	50
5	4	6	2	7	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	14	8	10	12	8
தனெ மறேக	வட மறேக	தனெ மறேக	தனெ கிழக்க	தனெ கிழக்க	காற்றின் திசை	தறெக	தறெக	தனெ கிழக்க	தறெக	தறெக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் சபெட்டம்பர் 23, 24, 25, 26ம் ததேகளில் லசோன மழயைம் மற்றும் 27 ததே மிதமான மழைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 36°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-25° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிக்க 8 மாதல் 14 கி.மீ வகேத்தில், தறெக மற்றும் தனெகிழக்க திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பபொது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு (22 சபெ- 0 அக்டபேர் 2023):

மழைப்பபொழிவு :

22-09-2023 - 28-09-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்பபி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடதலான மழை பபெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

மாவட்டத்தில் பொதுவாக இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

22-09-2023 - 28-09-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை விட சற்று கறைந்து காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

29-09-2023- 05-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை விட சற்று கறைந்து காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு

கறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

22-09-2023 - 28-09-2023: மாவட்டத்தில் கறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

29-09-2023 - 05-10-2023: மாவட்டத்தில் கறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 18° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

மகேமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுபொறி வதைத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுபொறி அட்டை வதைத்து அசுவினி மற்றும் இலதைதுளைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் செப்டம்பர் 23, 24, 25 மற்றும் 27ம் ததிகளில் இட் மின்னலுடன் கூடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆட்களான கிடலை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் போது போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கம்படியும் கட்டுகொள்ளப்படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கப் பொராட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலகோக மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கறேற வளோண் ஆலசனகைள் மாக்கிய பயிர்கள் : நிலக்கடலை, மிளகாய், கால்நடை

நிலக்கடலை:

நிலக்கடலையில் ஜிப்சம் இடுதல் நல்ல பயனை அளிக்கம்.

இரவலை பயிராக்கு ஒரு எக்டராக்கு 400 கிலகோ ஜிப்சம் வீதம் 40-45வது நாளில் (அ) மானாவாரிப் பயிராக்கு 40-75வது நாளில் செடிகளின் ஓரமாக மண்ணின் ஈரத்தன்மையைப் பொறுத்து இட வணேடும்.

மண்ணகைக் கொத்தி ஜிப்சம் இட்டு மண் அணகைக் வணேடும்.

கால்சியம் மற்றும் கந்தகக் கறைபாடள்ள நிலங்களில் ஜிப்சம் இடுதல் நல்ல பலனைத் தரம்.

மிளகாய் பயிரை தாக்கம் வரேர் அழுகல் நயோயைக் கட்டும்புடத்து மன்னச்செச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மிளகாய் பயிர், நடவா சயெவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு மன்பு, வபேப விதபைப் பபொபி @ 0.05கிராம் / கிலளே, வபேபபிண்ணாக்கு @ 0.15கிராம்/கிலளே மற்றும் பாதினா உரம் @ 0.75கிராம்/கிலளே ஆகியவற்றை கலந்து மண்ணில் இடவணேட்டும். மலேம், தபெுகளேனசலேல் 0.1%, கார்பாக்சின் 0.25% மற்றும் காளளேரளேதலளேனில் 0.20% ஆகிய பூஞ்சகைக்கொல்லிகளை கலந்து நடவா சயெய்த 7 நாட்களில் மண்ணில் (நனபைப்பது) ஊற்றுவதன் மூலம் இந்நயோயை திறம்பட கட்டும்புடத்து மடியும்.

கால்நடை:

பால் கறக்கப் பயன்புடத்தும் பாத்திரங்கள் மூலம் பாக்டீரியாக்கல் நிறயைப் பரெுக வாய்ப்புள்ளது.

காளிரவிப்பான்கள் மற்றும் பரெரிய பால் சமேிக்கும் கனே்கள். சாதாரண மூறயையில் காளிரந்த / வபெ்பமான தளொற்று நீக்கிகள் மூலமாகவளே சில தானியங்கி இயந்திரம் மூலமாகவளே சூத்தப்புடத்தலாம்.

ளந்த மூறயாகினும் காளளேரின் (50 பி.பி.ளம்.) கலந்த காளிரந்த நீரில் அலசி பின்பு இதர கரசைல்களை உபயளேகிக்கலாம்.

கழுவிய பின்பு ஈரம் பளேகாமளவா உலர வதைத்தல் அவசியம்.