



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 27-02-2024

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-02-27 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-02-28	2024-02-29	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-03
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	36.0	37.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	80	80	80	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	30	30	30	20
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	12	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	50	50	70	70	90
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

பிப்ரவரி நான்காவது வாரத்தில் இலேசான மற்றும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35.0°C -37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24.0°C -26.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டமான வானம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 முதல் 14 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

காய்க்கும் தென்னை மரங்களுக்கு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக் கலைக்கழக தென்னை டானிக் மரம் ஒன்றிற்கு 200 மில்லி வீதம் வோர்வழியாக அளிக்கவும்.

குறுஞ்செய்தி :

30 மற்றும் 45 வது நாட்களுக்குள்ளாக இலைவழிதெளிப்பாக யூரியா 2% தெளிப்பது உளுந்து மற்றும் பச்சைப்பயறின் விளைச்சலை அதிகரிக்கும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கரும்பு	கரும்பில் வாடல்நோய் தென்படும் விவசாயிகள் கார்பண்டசும் 2 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் வேர் பகுதியில் 15 இடைவெளியில் தெளிப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம் (அல்லது) எருவில்

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சூடோமோனாஸ் பிளோரசென்ஸ் மற்றும் டிரைக்கோடெர்மா விரிடி இரண்டு கிலோ/ஏக்கர் என்ற அளவில் கலந்து வேர் பகுதியில் இடலாம்.
உளுந்து	வறண்ட வானிலை நிலவுவதால் பயிர்களில் பச்சையத்தை நிலை நிறுத்த மெத்தைலோ பாக்டீரியாவை 1% காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெண்டை/ லேடிஸின் விரல்	வெண்டையை தாக்கும் நரம்புத் தேமல் நோய் நிர்வாகத்திற்கு, அசாடிராக்கின் 0.03 WSP @ 5 கிராம் /10 லி (அல்லது) மெத்தில் டெமெட்டன் 25 EC @ 1.6 மி/லி (அல்லது) தியாமெதொக்சாம் 25WG @ 2 கிராம்/லி தெளிக்கவும் மேலும் 15 நாட்களுக்குப்பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை தெளிக்கவும்.
தக்காளி	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக தக்காளி பயிரைத் தாக்கும் ஊசித்துளைப்பான் வரவாய்ப்பு உள்ளதால் ஏக்கருக்கு 16 இனக்கவர்ச்சி பொறிகள் வைத்து ஆண் அந்துப்பூச்சிகளைக் கவர்ந்தழிக்கவும், தேவை ஏற்படின், புளுபெண்டமைடு 20% டபிள்யூ ஜி 60 மி.லி/ ஏக்கர்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வறண்ட வானிலை நிலவுவதால் கோழிகளுக்கு அம்மை நோய் வரவாய்ப்பு உள்ளதால் தடுப்பூசி முறை, நண்பகல்நேர உணவு கட்டுப்பட்டு முறையை மற்றும் கொட்டகை வெப்பநிலை மேலாண்மை முறைகளை கையாளவும், கால்நடைமருத்துவரின் ஆலோசனைகளை பின்பற்றவும். .