



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா
இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-01-2024

கடலூர்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	2.0	2.0	2.0	11.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	29.0	29.0	30.0	29.0	29.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	60	60	70	90
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	14	14	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	50	50	50	20	20
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	3	4	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் வாரங்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் ஈரப்பதம் 90% ஆகவும், பகல் நேரங்களில் 60-90% ஆக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29.0-30.0 °C ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22.0-23.0 °C ஆகவும் இருக்கும். காற்றின் வேகமானது மணிக்கு 12-14 கி.மீ ஆக வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

07.01.2023 முதல் 13.01.2023 வரை தமிழ்நாட்டில் மழை இயல்பாகவும், மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை, அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பாகவும் இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

இலேசான மழையுடன் அதிக காற்றின் ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதால் வயல்களில் பூச்சி மற்றும் நோயின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்பொழுது நிலவி வரும் வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் இலைச்சுருட்டுப்புழு மற்றும் தண்டுத்துளைப்பான் தாக்கம் காணப்படுவதால் அதை கட்டுப்படுத்த கார்போசல்பான் 400 மிலி/ஏக்கர் அல்லது கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 600 கி/ஏக்கர் என்ற அளவில் காலை அல்லது மாலை தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	தற்பொழுது நிலவி வரும் வானிலையின் காரணமாக நிலக்கடலையில் புகையிலை வெட்டு புழு தாக்கம் தென்பட வாய்ப்புள்ளது இதைக் கட்டுப்படுத்த இனக்கவர்ச்சி பொறி ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் வைக்கவும். ஏக்கருக்கு ப்ரூபென்டிமைட் 20 WG 120 கிராம்என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
கரும்பு	தற்பொழுது நிலவிவரும் சூழ்நிலையில் கரும்பில் நுனிக்குருத்துப்புழுவின் தாக்கம் தென்பட்டால் கார்போபுரான் 3% CG @ 66 கிலோ/எக்டர் அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% G @ 18.75 கிலோ/எக்டர் அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 375 மில்லி /எக்டர் என்ற அளவில் இடவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
முந்திரி	தேயிலை கொசு பூச்சியைக்கட்டுப்படுத்த முதலில் தயாமீதாக்கடிம் 25% WG 100 கிராம்/எக்டர் தண்ணீரில் கலந்து துளிர்விடும் (ஃப்ளஷிங்) கட்டத்திலும், இரண்டாவது குளோர்பைரிபாலை 2.0 மில்லி/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பூக்கும் தருணம் மற்றும் மூன்றாவது புரொபனோபாஸ் 1.0 மில்லி/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து காய் பிடிக்கும் தருணத்தில் தெளிக்கவும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	காற்றின் ஈரப்பதன் அதிகமாக இருப்பதால் இளம் கன்றுகளுக்கு நுரையீரல் அழற்சி போன்ற நோய் தாக்கத்திற்கு வாய்ப்புள்ளது. எனவே கால்நடை மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறவும். கால்நடைகளின் மேய்ச்சல் நிலத்தில் பனித்துளி உலர்ந்தபின் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பவும்.