



தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

&

இந்திய வானிலைத் துறை

வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம், கோவை
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை

(03.07.2024 முதல் 07.07.2024)



அறிக்கை எண் 053/2024

தேதி 02.07.2024

மாநிலத்தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 30° செ முதல் 40° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 23° செ முதல் 29° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேரவெப்பநிலை 16° செ முதல் 21° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 12° செ முதல் 14° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தின் கடந்தவார வானிலை

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தின் 28.06.24 முதல் 01.07.24 வரையிலும் பகல்நேரவெப்பநிலை 28° செ முதல் 32° செ ஆகவும் இரவுநேரவெப்பநிலை 23°C to 25°C ஆகவும் காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 93 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 71 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 17-24 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (28.06.2024 முதல் 01.07.2024)				தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னிறிவிப்பு 07.07.2024- 08.30 வரை				
28/06	29/06	30/06	01/07		நாள்-1 03/07	நாள்-2 04/07	நாள்-3 05/07	நாள்-4 06/07	நாள்-5 07/07
13.4	7.0	3.5	9.2	மழை (மி.மீ)	3	1	2	4	2
31	28	32	32	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	30	29	29	28	28
23	24	25	24	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	23	22	22	22	21
7	4	7	8	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	8	8
86	83	81	93	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	80	80
76	71	78	81	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	60	60	50
21	21	17	24	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	18	18	20	16	14
230	230	230	230	காற்று வீசும் திசை	250	250	250	180	250

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (03.07.2024 முதல் 07.07.2024)

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இலோசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்சவெப்பநிலை 28° செ முதல் 30° செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செ முதல் 23° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 50 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்று

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	ஆற்காலம்	அன்னூர்	காரமங்கல	கிணத்துக்குடவு	மதுக்கணார்	பெரியநாயக்கண்பாளையம்	பொள்ளாச்சிவட்கு	பொள்ளாச்சிவெத்து	சாக்கார்	சாம்குனம்	சுல்தான்பெட்	குஹர்	தொண்டாழுத்தூர்
03-07-2024	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
04-07-2024	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
05-07-2024	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06-07-2024	5.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
07-07-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		வரும் 5 நாட்களில் மேற்கு மண்டலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தூறல் (அ) லேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேற்குதொடர்ச்சி மழையினை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மிதமானமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்றின் வேகமானது மணிக்கு 10 - 24 கி.மீ வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மண் ஈரத்தினை பொறுத்து இறவைப் பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் மேற்கொள்ளவும். மருந்து தெளிப்பினை காலை நேரங்களிலோ (அ) 3-4 மணிநேரம் மழையில்லாத வானிலை எதிர்பார்க்கப்படும்போது மட்டும் மேற்கொள்ளலாம்.
மக்காசோளம்	விதைப்பு	எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி இறவையில் மக்காசோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுணோபிரிட் மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேரத்தில் செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காசோளம் விதைத்த மூன்று நாட்களுக்குள் அட்ரசின் என்ற முளைக்குமுன் தெளிக்கும் களைக்கொல்லியினை ஏக்கருக்கு 400 கிராம் அளவில் 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
கரும்பு	வளர்ப்புவும்	உள்ளூர் பகுதிகளில் அதிவேகக் காற்று மற்றும் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது, எனவே கரும்பில் எதிரெதிர் வரிசைகளை விட்டம் கட்டி காற்றினால் சாயமல் பாதுகாக்கவும்.

பருத்தி	விதைப்பு	எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினை பயன்படுத்தி குளிர்கால கம்போடியா பருத்தி விதைப்பிற்கான நிலம் தயாரிக்கவும். விதைப்பினை வரும் ஆகஸ்டு 15ம் தேதிக்குள் முடிக்கவும்.
கொடி பூசணி	விதைப்பு	எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினை பயன்படுத்தி கொடி பூசணி வகைகளை போதுமான வடிகால் வசதி செய்து விதைக்கவும்.
வாழை	வளர்ப்புவம்	எதிர்பார்க்கப்படும் மணிக்கு 10 -24 கிமீ வரை வேக காற்றினை கருத்தில் கொண்டு 5 மாத வயதுடைய வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
திராட்சை		பருவமழை கால திராட்சையில் காய்ந்த மற்றும் வளர்ச்சியில்லாத கிளைகளை கவாத்து செய்ய இது நல்ல தருணமாகும்.
மஞ்சள்	வளர்ப்புவம்	எதிர்பார்க்கப்படும் சாதகமான வானிலையினைப் பயன்படுத்தி 30 மற்றும் 60 நாட்களுக்கு மேலான மஞ்சளுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 22 கிலோ யூரியா, 72 கிலோ பொட்டாஷ் உரங்களை மேலுரமாக இடவும்.
கால்நடைகள்		<p>காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. எனவே காற்றின் வேகத்தை குறைக்க கோழிக்கூடாரங்களில் சுற்றிலும் சாக்கு பைகளை தொங்கவிடவும்.</p> <p>வேகமான காற்றினால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நாவற்சினைப்போக்க கால்நடைகளுக்கு போதிய குளிர்ந்த நீர் அளிக்கவும்.</p> <p>எதிர்பார்க்கப்படும் காற்றின் அதிக ஈரப்பத்தின் காரணமாக பால் மாடுகளில் பால் கறப்பதற்கு முன்பும் கறந்த பின்பும் மடுவினை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலை கொண்டு கழுவி மடுவீக்க நோய் வராமல் தவிர்க்கவும்.</p>

குறுஞ் செய்தி

- எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினை பயன்படுத்தி கொடி பூசணி வகைகளை போதுமான வடிகால் வசதி செய்து விதைக்கவும்.