



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா
இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-03-2024

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-03-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-03-20	2024-03-21	2024-03-22	2024-03-23	2024-03-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	25.0	24.0	24.0	25.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	64	66	66	62	60
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	74	74	70	70
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4	6	4	4	4
காற்றின் திசை (கோணம்)	90	90	110	120	90
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	2	4	4	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் முக்கியமாக தெளிவாக இருந்து ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது நாட்களுக்கு லேசான மழையும், முதல் இரண்டு மற்றும் ஐந்தாவது நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 24- 25°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 11-12°செஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-66 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70-74 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 04-06 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது நாளுக்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், விவசாயிகள் மலை காய்கறிகளை விதைக்கும் பணியில் ஈடுபடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விதைகளை ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடு @ 4 கிராம்/கிலோ அல்லது பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் @ 10 கிராம்/கிலோ கொண்டு விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்க்கிருமிகளை கட்டுப்பாடுத்த விதை நேர்த்தி செய்யலாம். மேலும், எந்தவொரு பயிர் திட்டத்திற்கும் முன்பு மண் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.

குறுஞ்செய்தி :

பூண்டு குமிழ் விளைச்சலை அதிகரிக்க நடவு செய்த 30, 45 மற்றும் 60 நாட்களில் நீரில் கரையக்கூடிய நுண்ணூட்டச் சத்து கலவையை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.50 கிராம் என்ற அளவில் இலையில் இடலாம்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
முள்ளங்கி	கேரட்டில் நூற்புழு மேலாண்மைக்கு, நடவு செய்யும் போது எக்டருக்கு 1 டன் வேப்பம் பிண்ணாக்கு மண்ணில் இடவும். கடுகு செடிகளை உயிரி புகையாக்குதல் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு 250 கிலோ இடுதல், பர்ப்யூரோசிலியம் லிலாசினம் @ 5 கிலோ/எக்டருக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தேயிலை	தேயிலை பயிரில் சிலந்திப் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த, அசாடிராக்கின் 1.0% இசி (வேம்பு அடிப்படையிலானது) 2.0 மிலி/லிட் அல்லது புரோபார்கைட்டு 57% இசி 2.0 மிலி/லிட் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பாகற்காய்	பாகற்காயில் அசுவினி மற்றும் தத்துப்பூச்சி நிர்வகிக்க, இமிடாக்ளோபிரிட் 70 WG 1.0g/10lit இலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.